# 婦人科　化学療法レジメン

2026/5/28

| レジメン名 | 一般名 | 投与量 | 投与日 | 1クール |
|---|---|---|---|---|
| 子宮頸部 【CDDP+Rad】 | シスプラチン | 40mg /m2 | Day1,8,15,22,29,36 | 49日 |
| 子宮頸部 【CDDP+PTX】 | パクリタキセル<br>シスプラチン | 135mg /m2<br>50mg /m2 | Day1<br>Day2 | 21日 |
| 子宮頸部 【CBDCA+PTX】 | カルボプラチン<br>パクリタキセル | 5 AUC<br>175mg /m2 | Day1<br>Day1 | 21日 |
| 子宮頸部 【CPT-11】 | イリノテカン | 100mg /m2 | Day1,8,15 | 28日 |
| 子宮頸部 【CBDCA+PTX+Pembro+Bev】 | カルボプラチン<br>パクリタキセル<br>ペムブロリズマブ<br>ベバシズマブ | 5 AUC<br>175mg /m2<br>200mg /Body<br>15mg /Kg | Day1<br>Day1<br>Day1<br>Day1 | 21日 |
| 子宮体部 【AP】 | シスプラチン<br>ドキソルビシン | 50mg /m2<br>60mg /m2 | Day1<br>Day1 | 21日 |
| 子宮体部 【CBDCA＋PTX】 | カルボプラチン<br>パクリタキセル | 6 AUC<br>175mg /m2 | Day1<br>Day1 | 21日 |
| 子宮体部【DTX】 | ドセタキセル | 70mg /m2 | Day1 | 21日 |
| 子宮体部 【Lenvatinib + Pembrolizumab】 | ペムブロリズマブ<br>レンバチニブ | 200mg /Body<br>20mg | Day1<br>1日1回　連日 | 21日 |
| 子宮癌肉腫 【CBDCA+PTX】 | カルボプラチン<br>パクリタキセル | 6 AUC<br>175mg /m2 | Day1<br>Day1 | 21日 |
| 子宮癌肉腫【HAL】 | エリブリン | 1.4mg /m2 | Day1,8 | 21日 |
| 子宮癌肉腫【IP】 | イホスファミド<br>シスプラチン | 1500mg /m2<br>20mg /m2 | Day1,2,3,4<br>Day1,2,3,4 | 21日 |
| 卵巣 【CBDCA+PTX】 | カルボプラチン<br>パクリタキセル | 6 AUC<br>175mg /m2 | Day1<br>Day1 | 21日 |
| 卵巣 【PLDC】 | カルボプラチン<br>ドキソルビシン(リポソーム製剤) | 5 AUC<br>30mg /m2 | Day1<br>Day1 | 28日 |
| 卵巣 【GC】 | カルボプラチン<br>ゲムシタビン | 4 AUC<br>1000mg /m2 | Day1<br>Day1,8 | 21日 |
| 卵巣 【PLD】 | ドキソルビシン(リポソーム製剤) | 50mg /m2 | Day1 | 28日 |
| 卵巣 【GEM】 | ゲムシタビン | 1000mg /m2 | Day1,8,15 | 28日 |
| 卵巣 【Weekly PTX】 | パクリタキセル | 80mg /m2 | Day1,8,15,22 | 28日 |
| 卵巣 【PLD+BEV】 | ドキソルビシン(リポソーム製剤)<br>ベバシズマブ | 40mg /m2<br>10mg /Kg | Day1<br>Day1,15 | 28日 |
| 卵巣 【NGT1.25＋BEV】 | ベバシズマブ<br>ノギテカン | 15mg /Kg<br>1.25mg /m2 | Day1<br>Day1～5 | 21日 |
| 卵巣【dose-denseTC】 | カルボプラチン<br>パクリタキセル | 6 AUC<br>80mg /m2 | Day1<br>Day1,8,15 | 21日 |

# 婦人科　化学療法レジメン

2026/5/28

| レジメン名 | 一般名 | 投与量 | 投与日 | 1クール |
|---|---|---|---|---|
| 卵巣【CBDCA+PTX＋BEV】 | カルボプラチン<br>パクリタキセル<br>ベバシズマブ | 6 AUC<br>175mg /m2<br>15mg /Kg | Day1<br>Day1<br>Day1 | 21日 |
| 卵巣【followed by BEV(CBDCA+PTX＋BEV)】 | ベバシズマブ | 15mg /Kg | Day1 | 21日 |
| 卵巣【CBDCA+PLD＋BEV】 | カルボプラチン<br>ドキソルビシン(リポソーム製剤)<br>ベバシズマブ | 5 AUC<br>30mg /m2<br>10mg /Kg | Day1<br>Day1<br>Day1,15 | 28日 |
| 卵巣【followed by BEV(CBDCA+PLD＋BEV)】 | ベバシズマブ | 15mg /Kg | Day1 | 21日 |
| 卵巣【GC＋BEV】 | カルボプラチン<br>ゲムシタビン<br>ベバシズマブ | 4 AUC<br>1000mg /m2<br>15mg /Kg | Day1<br>Day1,8<br>Day1 | 21日 |
| 卵巣【followed by BEV(GC＋BEV)】 | ベバシズマブ | 15mg /Kg | Day1 | 21日 |
| 卵巣 【NGT1.5】 | ノギテカン | 1.5mg /m2 | Day1～5 | 21日 |
| 卵巣 【CPT-11】 | イリノテカン | 100mg /m2 | Day1,8,15 | 28日 |