

# 大腸内視鏡検査（日帰り入院）を受けられる患者様へ

＜予定入院期間 1日間＞ 1枚目(全1枚)

	検査前日	入院・検査当日			翌日
		検査前	検査中	検査後	
治療・処置	眠前に下剤を内服します。	入院後より腸管洗浄剤（ムーベン）をまずは1時間程度かけて飲んでください。排便の状態によっては続けて服用いただきます。 		病変を切除した場合、約1週間食事・飲酒・運動などに制限が必要となりますので、医師・看護師から説明いたします。	
薬・点滴	抗血栓薬は検査前に一時的に中断する場合があります。中止するお薬は（ <input type="text"/> ） 	基本的に朝と昼の薬の内服は中止ですが、内服する必要がある薬がある場合はお知らせします。 病棟で点滴を始めます。 	検査はつらくないように、痛み止めと眠くなる薬を使用します。	抗血栓薬（ <input type="text"/> ）の再開は、 <input type="text"/> からです。	
安静度		検査室へ行く前に排尿を済ませておいてください。検査室に行く時間になりましたら声をお掛けします。		検査前の注射により、一時的に物の見え方が変わることがありますので、ご注意ください。終日、運転は控えてください。また眠気やふらつきが出ることもありますので、目が覚めていることを看護師が確認してから退院となります。 	
食事	消化の悪い食べ物は控え、夕食は午後8時までにお済ませください。21時以降は食事は控えてください。	朝から検査が終了するまで食事は摂れません。水やお茶など透明な飲み物は飲んでも構いません。 			
排泄		便やガスがなく、黄色い水のようなことを確認します。（排泄時、看護師が確認いたします。）			
説明		検査着に着替え、紙パンツを履いて入室します。（検査に不要な装飾品ははずします。）		医師より検査結果の説明をいたします。   お腹の張った感じや痛みは排ガスとともに楽になりますが、気分が優れない場合は退院が延期となる場合があります。	
その他		持参されたお薬の内容や残数を確認します。ネームバンドをつけさせていただきます。			
		貴重品の管理は、セーフティーボックスをご利用ください。			 腹痛や下血などの症状があれば、当院にご連絡ください。

この表はおおよその経過をお示ししたものです。患者様の状況により変更になる場合がございます。